

Partus

- [begeleid natuurlijk verloop](#)
- vermijd persen tussen de weeën
- laat zuchten
- laat 3 keer persen in 1 wee



schouderdystocie



- laat stoppen met persen
- laat benen zo ver mogelijk optrekken
- beweeg hoofd met zachte tractie neerwaarts en laat persen

- ga aan rugzijde kind staan
- laat helper met vuist (twee vingers boven symfyse) schouder naar beneden drukken
- beweeg hoofd met zachte tractie neerwaarts en laat persen

- positioneer barend in knie-hand houding "all fours"
- beweeg hoofd met zachte tractie neerwaarts en laat persen

onmiddellijk transfer ziekenhuis

stuitligging



- positioneer barend op bedrand met opgetrokken benen
- alternatief: knie-hand houding "all fours"
- raak kind niet aan



indien punten schouderbladen zichtbaar:

- pak kind aan met "hamburgergreep"
- beweeg kind met rug naar buik moeder
- laat hoofd geboren worden



Pasgeborene, ondersteuning transitie / reanimatie →



oxytocine



oxytocine →



i.m.

5 IE

bij navelstrengomstrengeling:

- laat stoppen met persen
- haal / schuif navelstreng af
- klem navelstreng zo nodig af en knip door